

オータイロ DIARY

オータイロによる治療を受けている方へ

治療日誌について

- ■オータイロによる治療を安全に続けていくために、普段から 患者さんご自身でも体調の変化に気をつけていただくことが 大切です。
- オータイロ服用中に特に注意が必要な副作用(間質性肺 疾患、中枢神経系の副作用、骨折)について、チェック項目 としてまとめています。
- ●記入例を参考に、あてはまる症状に○をつけてください。
- ●受診の際には、この治療日誌を医師・薬剤師・看護師に 見せて、症状の有無を伝えるようにしましょう。
- ●症状の程度によってはすぐに対処しなければならないこと もあります。4ページにあるような症状がみられるときは、 すぐに病院に連絡するようにしましょう。
- ●オータイロを初めて服用する方は、飲み初めの2週間は 1日1回の服用です。以下の冊子に付録された日誌から ご利用ください。



ROS1融合遺伝子陽性 肺がん患者さん用



NTRK融合遺伝子陽性 固形がん患者さん用

記入例

日付

服用時刻

服用量 160mg



服用量



体温(℃)

息切れ・息苦しさ

空咳

胸の違和感

発熱

めまい

ふらつき

手足の動きが ぎこちない

ろれつが まわらない

もの忘れ

自分のいる場所や時間、 人の名前がわからない

気分の落ち込み

関節や骨の痛み・ 変形

手足を動かしたときに、 骨や関節に痛みがある

その他

2

3/	1	3/	/2
1回目	2回目	1回目	2回目
9:00	21:00	9:30	20:00 •
1 カプセル	1 カプ セル	1 カプ セル	カプ セル
カプ セル	カプ セル	カプ セル	3 カブ •
36.0	36.2	36.0	36.2
			0
\circ	0	0	

服用した日付を記入してください

服用した時刻を記入し、なるべく決まった 時間に服用するようにしましょう

処方されたカプセルがどちらかよく確認して、 服用したカプセルの数を記入してください

医師の指示で飲む量が変わったときは、 行を変えて記入してください

体温は毎日測るようにしてください

症状があるものに〇をつけてください



便秘気味 手足がピリピリする その他、気になることや 医師に伝えたいことを記録しましょう

病院にご連絡いただきたい症状

次のような症状がある場合は、すぐに病院にご連絡ください。

間質性肺疾患の疑い 息切れ、息苦しさ 痰のない乾いた咳 (空咳) が続く 胸の違和感 発熱
中枢神経系の副作用の疑い □ めまいが続く、繰り返す □ めまいで立っていられない □ ふらついてまっすぐ歩けない □ 手足の動きがぎこちない □ ろれつがまわらない □ もの忘れがひどい □ 自分のいる場所や時間、人の名前がわからなくなる
□ 気分の落ち込み□ 家族や周囲の人から、普段と様子が違うといわれるようになった
骨折の疑い 関節の痛み 骨や骨の周囲の痛み 骨の変形 手足を動かしたときに、骨や関節に痛みがある

オータイロ服用中に注意すること

間質性肺疾患を疑う症状がみられたら、すぐに病院に連絡してください。

息切れ、息苦しさ、乾いた咳が続く、胸の違和感、発熱などの症状があるときは、すぐに病院に連絡してください。



自動車の運転や危険を伴う 機械の操作に気をつけてください。

中枢神経系(めまい、運動失調、認知障害など)の副作用があらわれたときは、医師の指示に従い、症状が治まるまで自動車の運転や危険を伴う機械の操作をしないでください。





オータイロ電子添文2025年11月改訂(第4版)



	付	/	/	/	/	/	
	עין ו	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
朋	 跟用時刻	:	:	:	:	:	:
朋	展用量 160 mg	カプ セル	カブ セル	カブ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル
朋	展用量 40mg	カプ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル
섢	x温(℃)						
	息切れ・息苦しさ						
間質性	空咳						
間質性肺疾患	胸の違和感						
ies.	発熱						
	めまい						
4	ふらつき						
中枢神経系の副作用	手足の動きが ぎこちない						
経系の	ろれつが まわらない						
副作用	もの忘れ						
л	自分のいる場所や時間、 人の名前がわからない						
	気分の落ち込み						
骨 折	関節や骨の痛み・ 変形						
折	手足を動かしたときに、 骨や関節に痛みがある						
	その他 (気になること、 医師に伝えたい こと)						

/		/	/	/	/	/	/
1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
:	:	:	:	:	:	:	:
カブ セル	カブ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル
カブセル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル



	1付	/	/	/	/	/	
	נין ו	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
朋	B用時刻	:	:	:	:	:	:
朋	展用量 160mg	カプ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル
朋	展用量 40mg	カプ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブセル	カブ セル
섢	z温(℃)						
88	息切れ・息苦しさ						
間質性	空咳						
間質性肺疾患	胸の違和感						
154	発熱						
	めまい						
	ふらつき						
中枢神経系の副作用	手足の動きが ぎこちない						
経系の	ろれつが まわらない						
副作用	もの忘れ						
713	自分のいる場所や時間、 人の名前がわからない						
	気分の落ち込み						
骨折	関節や骨の痛み・ 変形						
折	手足を動かしたときに、 骨や関節に痛みがある						
	その他 (気になること、 医師に伝えたい こと)						

/		/	/	/	/	/	/
1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
:	:	:	:	:	:	:	:
カブ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル
カブセル	カプ セル						



_	付	/	/	/	/	/	
	עין ו	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
朋	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:	:	:	:	:	:
朋	展用量 160 mg	カブ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル
朋	展用量 40mg	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル
섢	z温(℃)						
88	息切れ・息苦しさ						
間質性	空咳						
間質性肺疾患	胸の違和感						
15%	発熱						
	めまい						
	ふらつき						
中枢神経系の副作用	手足の動きが ぎこちない						
経系の	ろれつが まわらない						
副作品	もの忘れ						
л	自分のいる場所や時間、 人の名前がわからない						
	気分の落ち込み						
骨	関節や骨の痛み・ 変形						
骨折	手足を動かしたときに、 骨や関節に痛みがある						
	その他 (気になること、 医師に伝えたい こと)						

/		/	/	/	/	/	/
1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
:	:	:	:	:	:	:	:
カブセル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル
カプセル	カプ セル						



	1付	/	/	/	/	/	/
	נין ו	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
那	界時刻	:	:	:	:	:	:
那	展用量 160mg	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル
那	展用量 40mg	カプセル	カプ セル	カプ セル	カブセル	カブ セル	カブ セル
体	z温(℃)						
88	息切れ・息苦しさ						
質性	空咳						
間質性肺疾患	胸の違和感						
/LX	発熱						
	めまい						
	ふらつき						
中枢神経系の副作用	手足の動きが ぎこちない						
経系の	ろれつが まわらない						
副作品	もの忘れ						
用	自分のいる場所や時間、 人の名前がわからない						
	気分の落ち込み						
骨折	関節や骨の痛み・ 変形						
折	手足を動かしたときに、 骨や関節に痛みがある						
	その他 (気になること、 医師に伝えたい こと)						

/		/	/	/	/	/	/
1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
:	:	:	:	:	:	:	:
カブ セル	カブ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル	カプ セル	カブ セル
カプセル	カプセル	カブ セル	カブ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル



	付	/	/	/	/	/	
	עין ו	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
朋	 跟用時刻	:	:	:	:	:	:
朋	展用量 160 mg	カプ セル	カブ セル	カブ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル
朋	展用量 40mg	カプ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル
섢	x温(℃)						
	息切れ・息苦しさ						
間質性	空咳						
間質性肺疾患	胸の違和感						
ies.	発熱						
	めまい						
4	ふらつき						
中枢神経系の副作用	手足の動きが ぎこちない						
経系の	ろれつが まわらない						
副作用	もの忘れ						
л	自分のいる場所や時間、 人の名前がわからない						
	気分の落ち込み						
骨 折	関節や骨の痛み・ 変形						
折	手足を動かしたときに、 骨や関節に痛みがある						
	その他 (気になること、 医師に伝えたい こと)						

/		/	/	/	/	/	/
1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
:	:	:	:	:	:	:	:
カプセル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプセル	カブ セル	カブ セル
カプセル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル



日付		/		/		/	
	עין ו	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
朋		:	:	:	:	:	:
朋	展用量 160 mg	カプ セル	カブ セル	カブ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル
朋	展用量 40mg	カプ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル
섢	x温(℃)						
	息切れ・息苦しさ						
間質性	空咳						
間質性肺疾患	胸の違和感						
ies.	発熱						
	めまい						
	ふらつき						
中枢神経系の副作用	手足の動きが ぎこちない						
経系の	ろれつが まわらない						
副作用	もの忘れ						
л	自分のいる場所や時間、 人の名前がわからない						
	気分の落ち込み						
毌	関節や骨の痛み・ 変形						
骨折	手足を動かしたときに、 骨や関節に痛みがある						
	その他 (気になること、 医師に伝えたい こと)						

/	/	/ /		/ /		/	/
1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
:	:	:	:	:	:	:	:
カプセル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプセル	カブ セル	カブ セル
カプセル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル



日付		/		/		/	
	עין ו	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
朋		:	:	:	:	:	:
朋	展用量 160 mg	カプ セル	カブ セル	カブ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル
朋	展用量 40mg	カプ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル
섢	x温(℃)						
	息切れ・息苦しさ						
間質性	空咳						
間質性肺疾患	胸の違和感						
ies.	発熱						
	めまい						
	ふらつき						
中枢神経系の副作用	手足の動きが ぎこちない						
経系の	ろれつが まわらない						
副作用	もの忘れ						
л	自分のいる場所や時間、 人の名前がわからない						
	気分の落ち込み						
毌	関節や骨の痛み・ 変形						
骨折	手足を動かしたときに、 骨や関節に痛みがある						
	その他 (気になること、 医師に伝えたい こと)						

/	/	/	/	/		/	/
1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
:	:	:	:	:	:	:	:
カブ セル	カブ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル	カプ セル	カブ セル
カプセル	カプセル	カブ セル	カブ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル



日付		/		/		/	
	עין ו	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
朋	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:	:	:	:	:	:
朋	展用量 160 mg	カブ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル
朋	展用量 40mg	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル
섢	z温(℃)						
88	息切れ・息苦しさ						
間質性	空咳						
間質性肺疾患	胸の違和感						
15%	発熱						
	めまい						
	ふらつき						
中枢神経系の副作用	手足の動きが ぎこちない						
経系の	ろれつが まわらない						
副作品	もの忘れ						
л	自分のいる場所や時間、 人の名前がわからない						
	気分の落ち込み						
骨	関節や骨の痛み・ 変形						
骨折	手足を動かしたときに、 骨や関節に痛みがある						
	その他 (気になること、 医師に伝えたい こと)						

/	/	/ /		/ /		/	/
1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
:	:	:	:	:	:	:	:
カプセル	カプセル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプセル	カブ セル	カブ セル
カプセル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カプ セル	カブ セル	カブ セル

	1付	/	/	/		/	
	עין ו	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
朋	界時刻	:	:	:	:	:	:
那	展用量 160mg	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル
那	展用量 40mg	カプセル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル	カブ セル
体	盂(℃)						
88	息切れ・息苦しさ						
間質性肺疾患	空咳						
肺疾患	胸の違和感						
	発熱						
	めまい						
	ふらつき						
中枢神経系の副作用	手足の動きが ぎこちない						
経系の	ろれつが まわらない						
副作品	もの忘れ						
用	自分のいる場所や時間、 人の名前がわからない						
	気分の落ち込み						
骨折	関節や骨の痛み・ 変形						
折	手足を動かしたときに、 骨や関節に痛みがある						
	その他 (気になること、 医師に伝えたい こと)						

記録ページ

普段と違う症状がみられたら、すぐに病院に連絡してください。 その際にご自身のことを伝えられるようにメモしておくとよいでしょう。

お名前:	
性別:	
年齢:	
アレルギーの有無:	
ご連絡先:	
ご家族のご連絡先:	
その他:	



緊急連絡先

病院名:

担当医師名: